



Når bør jeg ikke bruke Zyx?

Ved overfølsomhet

Zyx bør ikke brukes hvis du er overfølsom overfor virkestoffet eller hjelpestoffer.

- Zyx inneholder aspartam (søtningsmiddel). Det er en fenylalaninkilde og kan derfor være skadelig om du lider av fenylketonuri.
- Zyx inneholder isomalt. Pasienter som lider av fruktoseintoleranse bør ikke bryke Zyx.
- Zyx bør ikke brukes hvis du er allergisk mot aspirin eller NSAIDS.
- Zyx bør ikke brukes hvis du er overfølsom for salisylsyre

Hvis du har eller har hatt astma

Hvis du har eller har hatt astma, kan Zyx medføre kramper i luftveiene.

Under graviditet og amming


Zyx bør ikke tas under graviditet og amming siden det ikke er gjort tilstrekkelige studier.

Barn under 6 år skal ikke bruke Zyx

Kan tas av barn fra 6 år og oppover. For barn mellom 6 og 11 år bør Zyx gis under kontroll av en voksen på grunn av størrelsen på tablettene.

MERK!

Blir du ikke bedre innen 3 dager, kontakt lege. Les instruksjonene på pakken før bruk.



Zyx - Smertestillende for halsen!

De fleste nordmenn opplever vondt i halsen i løpet av året. Ofte skyldes smerten infeksjon og den kommer gjerne sammen med en forkjølelse. Med Zyx så får man smertestillende tilpasset halsen. Du får kjøpt den reseptfritt på apoteket. Les mer om hvorfor dette faktisk virker på smertene i halsen.



Hverdagsplager - Følg oss på Facebook!

Vondt i halsen kan være veldig plagsomt, og er en av mange typiske hverdagsplager. På Facebooksiden vår kan du få tips, råd og kunnskap om hva som kan bidra til for eksempel å lindre sår hals.



Her får du kjøpt Zyx!

Zyx kan kjøpes reseptfritt på nett eller på ditt nærmeste apotek.